

Příbalová informace pro uživatele

Paravit™-CF roztok

Vitamínový preparát ve formě roztoku

Paravit™-CF roztok je potravina pro zvláštní lékařské účely. Paravit™-CF roztok je určen pro dietetický režim pacientů s cystickou fibrózou. Paravit™-CF roztok obsahuje vyšší množství vitamínů rozpustných v tucích než běžné potravinové doplňky.

Důležitá upozornění

Používejte pod lékařským dohledem. Paravit™-CF roztok se nesmí používat jako jediný zdroj výživy a nepředstavuje náhradu pestré stravy. Paravit™-CF roztok byl navržen specificky pro pacienty s cystickou fibrózou a měl by být používán pouze touto skupinou, jelikož je určen pouze pro osoby s tímto onemocněním. V případě konzumace osobami, které netrpí zdravotním postižením, pro něž je Paravit™-CF roztok určen, může tento přípravek představovat zdravotní riziko. Paravit™-CF roztok se smí používat během těhotenství pouze na základě doporučení lékaře.

Jak se Paravit™-CF roztok používá a uchovává

Pouze pro perorální podání (podání ústy). Paravit™-CF roztok se má užívat s jídlem. O tom, jak máte Paravit™-CF roztok užívat, se poradte se svým dietetickým specialistou na cystickou fibrózu. Uchovávejte při pokojové teplotě, na chladném a suchém místě. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Paravit™-CF roztok nepoužívejte, je-li uzávěr na lahvičce poškozen ještě před zahájením užívání přípravku. Po otevření spotřebujte do 28 dnů. Paravit™-CF roztok se dodává s kapátkem uzavřeným v pouzdru. Při přípravě k použití otevřete lahvičku s roztokem tak, že rozlomíte její uzávěr a šroubovací víčko zlikvidujete. Kapátko po použití našroubujte na lahvičku místo víčka.

Jaké množství Paravit™-CF roztoku se má užívat

Doporučené výchozí dávkování Paravit™-CF roztok vychází z doporučení organizace Cystic Fibrosis Trust 2016 a z pokynů ESPEN-ESPGHAN-ECFS pro nutriční péči u kojenců, dětí a dospělých s cystickou fibrózou z roku 2016.

Toto dávkování je následující:

- Kojenci ve věku 0 až 12 měsíců: 0,125 ml denně, odměřuje se pomocí samostatně dodávané stříkačky. Případný nespotebovaný roztok po 28 dnech zlikvidujte.
- Děti ve věku 1 až 8 let: 0,25 ml denně (odměřuje se podle značky 0,25 ml na dodávaném kapátku).
- Děti starší 8 let (včetně dospělých): 0,5 ml denně (odměřuje se jako dvojnásobek objemu 0,25 ml podle značky na dodávaném kapátku).

Doporučené denní dávky jsou vyšší než v případě normálního potravinového doplňku. Důvodem je zohlednění potíží s nedostatečným vstřebáváním u pacientů s cystickou fibrózou.

Nepřekračujte uvedenou denní dávku.

7 ml tekutého přípravku představuje dostatečný objem na 14 dnů léčby dospělého (nebo dítěte staršího 8 let) a na 28 dnů léčby dítěte (ve věku 1 až 8 let). Aby bylo zajištěno, že kapátko bude schopno nabrat celých 7 ml roztoku během doby léčby, je objem roztoku v lahvičce zvýšen o 1 ml (celkový obsah tudíž činí 8 ml). Na konci příslušného období léčby zůstane v lahvičce určité množství roztoku, kterou je třeba následně zlikvidovat.

Složení

Vitamín E (DL- α -tokoferyl acetát), triglyceridy se středně dlouhým řetězcem, vitamín K1 (fytomenadion), vitamín A (retinyl palmitát), vitamín D3 (cholecalciferol).

Nutriční hodnoty

Složka	Jednotka	Na 0,25 ml z kapátka	Na 100 kcal	Na 100 ml
Energie	kJ/kcal	2,09/0,50		836/200
Tuky	gramy	0,075 (z toho nasycených 0,075)		30 (z toho nasycených 30)
Sacharidy	gramy	0 (z toho cukry 0)		0 (z toho cukry 0)
Bílkoviny	gramy	0		0
Sůl	gramy	0		0
Vitamín A	mikrogramy	1 515 (= 5 000 IU)	303 000 (= 1 000 000 IU)	606 000 (= 2 000 000 IU)
Vitamín D3	mikrogramy	37,5 (= 1 500 IU)	7 500 (= 300 000 IU)	15 000 (= 600 000 IU)
Vitamín E	miligramy	100 (= 150 IU)	20 000 (= 30 000 IU)	40 000 (= 60 000 IU)
Vitamín K1	mikrogramy	5 000	1 000 000	2 000 000

IU = mezinárodní jednotky

Distribuci v ČR zajišťuje:

NORDIC Pharma, s.r.o., K Rybníku 475, 252 42 Jesenice u Prahy

Paravit™-CF roztok je vyroben v Itálii pro ParaPharm Development Limited.

Datum zpracování příbalové informace: 07/2018